エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝肺癌TS-1＋CDDP

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿m^2
Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1クール投与スケジュール（日目） 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	TS-1	★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														
2	シスプラチン（CDDP）	60mg/m^2	点静	120								↓																										
	体表面積																																						
	★TS-1　1.25m^2未満	40mg×2回/日																																					
	1.25～1.5m^2未満	50mg×2回/日																																					
	1.5m^2以上	60mg×2回/日																																					
前投薬	デキサメタゾン		点静																																				
	ファモチジン		点静																																				
	5-HT_3拮抗薬		適宜　利尿剤（ﾗｼｯｸｽ）、抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤（ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ）																																				
投与日程																																							
副作用																																							

	1クール期間	35日	クール回数	
	休薬期間			＊JCOG副作用判定基準　Grade4
	☆予想される重篤副作用		・TS-1＝骨髄抑制 ・ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ＝早期：胃腸症状（嘔吐・下痢）、腎障害。　2週間前後：骨髄抑制	
	☆副作用対策		補液（3～4L投与すること）。利尿剤（ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与日含め数日、蓄尿すること）。Hgb、Plt↓：輸血（grade4） 制吐剤（①5-HT_3拮抗薬、②①無効時はすぐにｽﾃﾛｲﾄﾞ使用：ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125mg　div/1hr等）、好中球＜500：G-CSF	
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	grade4の副作用全般→　次回投与量を8割とするか中止。 好中球減少時の感染（→中止、抗生剤投与）	