

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名=胃癌TS-1+PTX

(対象疾病=)

《初回開始日》 年 月 日

今回〔 〕クール目

身長= _____ cm

体重= _____ kg

体表面積= _____ m²

Ccr = _____

担当医	

薬剤 (商品名, 一般名)	1日投与量 (/m ² or /kg)	投与法 点静・静注	投与時間 (min)	1クール投与スケジュール(日目)														休薬7日					休薬14日											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	点静	120	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休					休												
2 TS-1	80mg/m ² *	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
体表面積																																		
★TS-1 1.25m ² 未満	40mg × 2回/日																																	
1.25~1.5m ² 未満	50mg × 2回/日																																	
1.5m ² 以上	60mg × 2回/日																																	
前投薬	5-HT ₃ 拮抗薬 デキサメタゾン ファモチジン ポラミン	1A 点静 点静 点静 点静		↓	↓										↓	↓																		
投与日程																																		
副作用																																		
1クール期間	2週投与1週休薬	どちらも可																																
休薬期間	2週投与2週休薬																																	
☆予想される 重篤副作用		白血球減少、アレルギー反応、末梢神経障害(主にPTX) 食欲低下、眠気、口内炎、色素沈着、など(主にTS-1)																																
☆副作用対策		減量、アレルギーに対しては前投薬の強化。																																
☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	WBC<2000 (Seg<1000) 強いアレルギー反応の出現。																																