

### 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝乳癌CMF

（対象疾病＝ ）

《初回開始日》 年 月 日  
 今回〔 〕クール目

身長＝ cm  
 体重＝ kg  
 体表面積＝ m<sup>2</sup>  
 Ccr ＝

担当医

薬剤 (商品名, 一般名)	1日投与量 (/m <sup>2</sup> or /kg)	投与法 点静・静注	投与時間 (min)	1クール投与スケジュール(日目)																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1 エンドキサン(CPA)	100mg/body	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
2 メトトレキサート(MTX)	40mg/m <sup>2</sup>	点静	30	↓																																	
3 5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	点静	60	↓																																	
4																																					
前投薬	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬 デキサメタゾン 1A 8.25mg	点静 点静		↓																																	
投与日程																																					
副作用																																					
1クール期間	28日	クール回数	6※	※アジュバント時																																	
休薬期間																																					
☆予想される重篤副作用		脱毛、嘔気、白血球減少、口内炎																																			
☆副作用対策		白血球1,000以下, 好中球500以下の時、G-CSF投与 嘔気対策としてはデキサメタゾンの前投薬、5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬等の使用。																																			
☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他																																				