

ラジオ波（RFA）クリニカルパス

日付	/	/	/
病日	入院当日	手術当日（術前）	手術当日（術後）
食事	 常食（普通食） ※治療食になる場合があります 治療食の場合は、病院食以外 食べないで下さい	朝食が半分出ます 昼食は出ません ※昼食が出る場合は、 前日にお知らせします	 術後3時間から水分可 夕食は出ます ※横になって食べられるよう、 おにぎり食になっています
安静度	 制限はありません	 帰室から3時間は絶対安静 ※寝返りもできません 帰室から3時間以後から翌朝医師診察後 までは、ベッド上安静です ※ベッドアップは45度まで	
排泄	制限はありません	 尿器・差し込み便器・オムツ・ 尿管のいずれかでの排泄です	
検査・治療	 採血・レントゲン・心電図 ※CT・超音波などをすることが あります	 12時頃から点滴を始め ます(21時頃まで)	3階の手術室で行います (1番目の方が13：30からです)
処置		 点滴前に手術着を着ます	
内服薬	 入院時、常用薬の確認をしま す ※血液をサラサラにする薬を 飲んでいる場合は、お申し 出 下さい		 痛いときは痛み止めを使いますので、 我慢せずにお申し出下さい

日付	/	/	/	/
病日	治療翌日	治療後2日	治療後3日	治療後4日以降
食事	 常食（普通食） （CT検査が終わるまでは食事ができません）	 常食		
安静度	 朝、医師の診察が終わるまでベッド上安静 以後、制限はありません	 制限はありません		
清潔	 検査着から着替えをします	 入浴可		
検査	 6～7時頃に採血をします 腹部CTをします （翌日になる場合があります）			
治療	 朝食後・夕食後に抗生剤の点滴をします （それぞれ30～45分くらいかかります）	前日の熱が 37.5度を上回らなければ、抗生剤 点滴はありません	→	→
処置	 朝、医師が傷口の消毒をします 尿道カテーテルを入れた方は、朝抜きます			
内服薬	 通常通りです			
説明	 抗凝固剤・抗血小板剤の内服薬を中止している方は、内服再開時 医師・または看護師から説明があります	CTの結果、追加治療が必要な時は、医師より お話をします		