

経尿道的尿管結石破砕術（TUL）クリニカルパス 2024年3月改訂

日付	/	/	/
病日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）
食事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 朝から絶飲食	 術後3時間から看護師の付き添いで少量の水が飲めます
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	翌朝まで起き上がることはできません （ベッドの上で寝返りはできます） 
清潔	手術前日にシャワー浴をします。 		
排泄			手術後は尿の管が入ります
治療		午前中に呼び出しがあり、点滴の針を挿入します。針が入りましたら点滴を開始します	帰室後より酸素マスクを数時間装着します
処置	 21時に下剤を内服します	 手術着を着て準備します。 順番になりましたら手術室へ向かいます。 血栓予防のため手術前に両足にストッキングを着用します。	尿道や下腹部に痛みがある時や、尿意が強い時は痛み止めの点滴や坐薬を使います。 痛みがある際には我慢せずに教えてください。
説明	 麻酔科医の説明および看護師（手術室・病棟）より手術前後の説明があります		 手術後、医師から手術の説明をします
指導	 常用薬をお預かりします 薬剤師が薬の確認をします	内服指示のある常用薬のみ朝7時頃内服します （内服する薬は前日に看護師より説明があります）	手術後足が動くようになっても、翌朝までは上半身を起こさないでください
その他	必要物品（テープ式オムツ）をご持参ください。 手術当日に使用しますので、入院時に確認をさせていただきます。		