≪大腸癌≫

レジメン名＝大腸癌XELOX(外科)

化学療法レジメン

（対象疾病＝大腸癌 ）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回（　　）クール目

身　長＝＿＿＿＿ cm
体　重＝＿＿＿＿ kg
体表面積＝＿＿＿＿ m^2
Ccr　＝＿＿＿＿

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（ /m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間 (min)	1クール投与スケジュール(日目) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	エルプラット(ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ)	130mg/m^2	点静	120	↓																												
2	ゼローダ(CAP)：C法	2，000mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)															
	体表面積				（ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前）																														
	★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.36m^2未満	1,200mg×2回/日																															
	1.36～1.66m^2未満	1,500mg×2回/日																															
	1.66～1.96m^2未満	1,800mg×2回/日																															
	1.96m^2以上	2,100mg×2回/日																															
前投薬	5-HT_3拮抗薬	1A	点静		↓																												
前投薬	デキサメタゾン	6.6～13.2mg	点静		↓																												
投与日程																																	
副作用																																	

	1クール期間	21日	クール回数
	休薬期間		
	☆予想される重篤副作用		末梢神経毒性、血液毒性、手足症候群
	☆副作用対策		対症療法と減量又は休薬 手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	WBC＜3，000 （好中球＜2，000） 末梢神経障害、手足症候群