エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝大腸癌TS-1＋隔週CPT-11＋BEV

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿m^2

Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	アバスチン（BEV）	5mg/kg	点静	30～90※	↓														↓															
2	イリノテカン(CPT-11)	100mg/m^2	点静	120	↓														↓															
3	TS-1	80mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																
	体表面積																																	
	★TS-1　1.25m^2未満	40mg×2回/日																																
	1.25～1.5m^2未満	50mg×2回/日																																
	1.5m^2以上	60mg×2回/日																																
前投薬	5-HT_3拮抗薬	1A	点静		↓														↓															
	デキサメタゾン	6.6mg	点静		↓														↓															
投与日程																																		
副作用																																		

1クール投与スケジュール（日目）

1クール期間	28日	クール回数	
休薬期間			

※アバスチンは、初回投与時は、90分で点静、忍容性良好であれば、60分で点静可能。2回目の投与で忍容性良好であればそれ以後の投与は、30分で点静可能。

【備考】	
☆予想される重篤副作用	骨髄抑制、下痢・嘔吐、腸炎、消化管出血、間質性肺炎 ***消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症・高血圧性クリーゼ、可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全(アバスチン)***
☆副作用対策	補液、制吐剤 ***緊急対応ガイド参照・適正使用ガイド参照(アバスチン)***
☆実施中止条件	重篤な骨髄抑制、高度な下痢など

(アバスチン休薬基準)　　G：Grade

・G3以上の血液毒性または、G2以上の非血液毒性

・出血G2、タンパク尿G2、肝機能障害G3

(アバスチン中止基準)

・過敏症G3,消化管穿孔または裂開が発現した場合、出血G3、喀血G1、血栓症/塞栓症（静脈系）G3

・血栓症/塞栓症(動脈系)G1、高血圧（薬剤によるコントロール不可能なG3)、タンパク尿G4

・可逆性後白質脳症症候群出現時、中枢神経障害症状または画像所見が認められた場合

※国内臨床試験の基準を参照