エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝大腸癌XELIRI

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿m^2

Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（ /m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1クール投与スケジュール(日目) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イリノテカン(CPT-11)	200mg/m^2	点静	90	↓																													
2	ゼローダ(CAP)	1600mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)															
	体表面積				（ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前）																													
	★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.31m^2未満	900mg×2回/日																																
	1.31～1.69m^2未満	1200mg×2回/日																																
	1.69～2.07m^2未満	1500mg×2回/日																																
	2.07m^2以上	1800mg×2回/日																																
前投薬	5-HT_3拮抗薬	1A	点静		↓																													
	デキサメタゾン	6.6mg	点静		↓																													
投与日程																																		
副作用																																		
	1クール期間	21日	クール回数																															
	休薬期間																																	

	☆予想される重篤副作用		骨髄抑制、下痢・嘔吐、血液毒性、手足症候群
	☆副作用対策		対症療法と減量又は休薬、前投薬強化、補液 手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	PS3以上あるいはCPT-11投与7日前までにPS2であればスキップして次のコースへ。 重篤な骨髄抑制、高度な下痢など WBC＜3000（好中球＜2000）